

PARTICULARITES DE L'ELEVAGE FRANCAIS

Exemple de l'élevage de Bruno Dufayet




Bruno DUFAYET, éleveur de salers

① Sur 4,1 millions de vaches allaitantes, 205 000 salers

ELEVAGE ALLAITANT

Vaches nourrices en 2009


[en nombre de têtes] Source : Agreste



ELEVAGE LAITIER


Vaches laitières en 2009

[en nombre de têtes] Source : Agreste



② Des exploitations de taille familiale

- 101 000 exploitations allaitantes
- 56 % des élevages de plus 5 vaches



Source : Agreste - Recensement agricole 2010.

③ Un élevage allaitant herbager spécialisé

En zone
de
moyenne
montagne



En zone
de
montagne



En zone
de plaine



En France :



- **13 millions** d'hectares de **prairies et de parcours**
(20 % du territoire, 45 % de la SAU)



63 hectares de prairies naturelles,
100 % de la surface




- **1,4 millions** d'hectares de **maïs fourrage**
- **2,5 millions** d'hectares de **céréales**

Répartition des différents systèmes d'élevage :

MONDE



- Pâturage / herbager
- Mixtes (polyculture-élevage) Production industrielle (Hors-sol)




Source FAO-2011

FRANCE :



- Pâturage herbagers
- Mixte (polyculture-élevage)



Source Idele en répartition des UGB herbivores.

Trois systèmes d'élevage allaitant majoritaires en France :

- **54 000 élevages de « naisseurs spécialisés » :**

Systemes en zone herbagère, basé sur la production de l'herbe. Exploitation maximale des ressources fourragères pour l'alimentation des bovins. Production d'animaux maigres sevrés (broutards) vendus à des ateliers d'engraissement.

Objectif de l'éleveur : **un veau / vache / an**

- **5 200 élevages « engraisseurs spécialisés »**

souvent en complément de grandes cultures ou d'autres productions animales,

- **15 800 élevages « naisseurs-engraisseurs »**

Combinaison des deux premiers systèmes




Particularité de cet élevage allaitant :
> 80% Monte naturelle



Engraisseurs ou
Naisseur-engraisseurs

Dominante
Naisseur


Elevage Dufayet



Systeme basé sur la production de l'herbe

Vitesse de croissance en kg M.S. / ha / jour


Production de l'herbe tout au long de l'année



Vêlages

Mai – juin :
Reproduction

Devenir de veaux nés en élevage allaitant :



LABEL ROUGE SALERS : 375 ELEVEURS



Sélection des animaux : race Salers obligatoire, entre 28 à 120 mois pour les vaches, 30 à 48 mois pour les bœufs

Alimentation des animaux : Veau élevé par sa mère jusqu'au sevrage naturel
Au pâturage plus de 6 mois par an, 100% végétale, minérale et vitamines
Interdiction de l'ensilage de maïs pendant la finition,

Conditions d'élevage : Bien-être des animaux au pâturage et à l'étable
respect de l'environnement, valorisation de l'herbe.

Sélection des carcasses à l'abattoir et maturation de la viande :
Poids, conformation, état d'engraissement et couleur de viande sont évalués
Maturation minimale de 12 jours.

4 L'alimentation des bovins français



Ration printemps – été : herbe en pâture d'avril à fin novembre

Ration été : en année de sécheresse, complémentation au foin au pré

Ration automne : à partir de mi octobre, Transition alimentaire vers l'hiver, distribution de foin

Ration hivernale : en bâtiment, foin plus 1 à 2 kg de céréales achetées, plus CMV




**AUTONOMIE
ALIMENTAIRE :
90%**





Ration alimentaire moyenne des bovins allaitants



80 % d'herbe pâturée et conservée



PHAE

MAE PHAE 2011 :

52 860 dossiers

3,62 M ha

239 M€ payés



Cofinancement

Etat (25%) et FEADER (75%)

27 % de la surface en prairies et parcours

MAE prime herbagère agroenvironnementale 2011

Superficies engagées par département et montants payés par région



Systeme non polluant : rôle des prairies dans le stockage du carbone

La compensation atteint entre 50 % et 100 % du méthane entérique émis, et entre 25 % et 55 % des émissions totales de gaz à effet de serre sur l'exploitation.



Chiffres-clés

570 kg de carbone/ha/an sont stockés en moyenne par les prairies permanentes.

80 kg de carbone/ha/an sont stockés en moyenne par les prairies temporaires soumises à des phénomènes de stockage et de déstockage en fonction de la fréquence du travail du sol.

125 kg de carbone/100 mètres linéaires/an sont stockés en moyenne sous les haies (racines).

Bien être animal

- **Suivi sanitaire du troupeau** : visite vétérinaire annuelle, tenue d'un cahier sanitaire, respect des délais d'utilisation des antibiotiques... contrôle permis grâce à l'identification individuelle obligatoire de chaque animal.
- **Déparasitage**
- **Transport** : respect normes transport européen, camion confort, abattoir à 50 km pour la majorité des animaux...



CCL : la production bovine française est issue d'un élevage :

- **de taille familiale**
- **avec des races à viande spécialisées ou rustiques**
- **traditionnellement en lien avec la production d'herbe**
- **qui participe à l'entretien du paysage et au maintien de la biodiversité**
- **qui respecte le bien être animal**

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

